

## Prospecto: información para el paciente

### **ANAFLAT 50mg TABLETA MASTICABLE**

Simeticona

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 10 días.

#### **1. ¿Qué es ANAFLAT 50mg Tableta masticable y para qué se utiliza?**

ANAFLAT 50mg Tableta masticable contiene el principio activo simeticona, que pertenece a un grupo de medicamentos que actúa destruyendo las burbujas de gas, facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasiona.

**ANAFLAT 50mg Tableta masticable** está indicado en alivio sintomático de los gases en adultos y adolescentes a partir de 12 años.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 10 días o tiene estreñimiento que no mejora.

#### **2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar ANAFLAT 50mg Tableta masticable?**

##### **No tome ANAFLAT 50mg Tableta masticable:**

Si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Si sufre perforación u obstrucción intestinal conocida o sospechada.

##### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico antes de empezar a tomar **ANAFLAT 50mg Tableta masticable**.

Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 10 días de tratamiento, o tiene estreñimiento que no mejora, debe suspender el tratamiento y consultar al médico.

**Niños.** No se recomienda en menores de 12 años.

## **Toma de ANAFLAT 50mg Tableta masticable con otros medicamentos**

Comuníquese a su médico que está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

La absorción de levotiroxina (medicamento usado en el tratamiento de enfermedades y disfunciones de la glándula tiroides) puede verse afectada si al mismo tiempo se administra simeticona por lo que la toma de preparados con levotiroxina y preparados con simeticona debe separarse al menos 4 horas.

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

La influencia de **ANAFLAT 50mg Tableta masticable** sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas es nula.

### **3. Cómo tomar ANAFLAT 50mg Tableta masticable.**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico. En caso de duda, pregunte a su médico.

#### Adultos y adolescentes mayores de 12 años:

La dosis recomendada es de 1-2 tabletas masticables (50-100 mg de simeticona) tres veces al día, después de cada una de las principales comidas.

No administrar más de 9 tabletas al día (correspondientes a 450 mg de simeticona).

#### Forma de administración

Este medicamento se administra por vía oral.

**Debe masticar bien los comprimidos antes de tragarlos (no deben tragarse enteros).**

Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 10 días de tratamiento, o tiene estreñimiento que no mejora, debe suspender el tratamiento y consultar al médico.

### **Si toma más ANAFLAT 50mg Tableta masticable del que debe:**

No se conocen casos de sobredosificación.

Aún en el caso de que se ingiera una cantidad muy superior a la indicada, es muy poco probable que se produzcan efectos adversos, debido a la falta de absorción digestiva del medicamento.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico.

### **Si olvidó tomar ANAFLAT 50mg Tableta masticable.**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si persisten los síntomas puede tomar otra dosis, siguiendo las instrucciones indicadas en este apartado 3. **Cómo tomar ANAFLAT 50mg Tableta masticable.**

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de la simeticona se han observado los siguientes efectos adversos de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

- Estreñimiento transitorio moderado y náuseas.
- Pueden producirse eructos que constituyen el mecanismo normal de eliminación de los gases con este tratamiento.
- Reacciones alérgicas (de hipersensibilidad) tales como erupción, picor en la piel, hinchazón en la cara o en la lengua o dificultad para respirar.

*Ante la sospecha de Reacción o Evento adverso asociado al uso del medicamento, debe comunicar al Centro Nacional de Farmacovigilancia a través del sistema de notificación en línea (<http://cnfv.salud.sv>) en hoja RAM/ESAVI, por vía telefónica al 2522-5056 o directamente al Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Paill al correo electrónico [farmacovigilancia@paill.com](mailto:farmacovigilancia@paill.com) o por vía telefónica al 2231-3643.*

### **5. Conservación de ANAFLAT 50mg Tableta masticable.**

Almacenar a una temperatura no mayor de 30° C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### **PRESENTACIONES:**

Caja x 40 tabletas masticables.

Caja x 10 tabletas masticables.

Caja x 2 tabletas masticables (muestra medica)

Dispensador x 30 tabletas masticables.

Dispensador x 50 tabletas masticables.



**MODALIDAD DE VENTA:**

Sin Receta Médica.

**Producto Centroamericano, fabricado en El Salvador por Laboratorios Farmacéuticos PAILL.**