

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

1. ¿Qué es AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE y para qué se utiliza?

AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE es agua estéril pura. Se usa para diluir medicamentos antes de su uso por vía intramuscular e intravenosa.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE?

No use AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE en las siguientes situaciones:

No se debe inyectar AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE. Sola. Si se inyecta sola en la corriente sanguínea puede provocar que los glóbulos rojos absorban agua y exploten (hemólisis). Esto ocurre porque el agua para preparaciones inyectables no tiene la misma consistencia que la sangre.

Antes de la administración, un profesional sanitario mezclará siempre AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE con uno o más medicamentos. Estos le dirán si puede o no recibir la solución.

Debe leer el prospecto del medicamento o medicamentos que se mezclen con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE.

Advertencias y precauciones.

El agua para preparaciones inyectables no se debe administrar sola. Antes de usar Agua para preparaciones inyectables: siempre se mezclará con uno o más medicamentos, su profesional sanitario se asegurará de que la mezcla tiene aproximadamente la misma consistencia que su sangre (isotónica).

Tendrá más probabilidades de sufrir hemólisis si se le administran grandes volúmenes de soluciones hipotónicas de Agua para preparaciones inyectables (soluciones que no son tan concentradas como su sangre).

Antes de administrarle medicamentos mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE su médico comprobará que: los medicamentos sean estables en AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE, los medicamentos no interaccionen unos con otros.

USO DE AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE CON OTROS MEDICAMENTOS:

Informe a su médico si está usando, ha usado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Los medicamentos que se usan disueltos en AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE pueden interaccionar unos con otros.

USO DE AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE CON ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Consulte con su médico sobre qué puede comer o beber.

EMBARAZO, LACTANCIA Y FERTILIDAD

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Los riesgos para el feto o para su embarazo dependerán de los medicamentos que utilicen mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE. Los riesgos para el bebé durante la lactancia dependerán de los medicamentos que utilicen mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE. Su médico le podrá informar sobre los riesgos que comporta cada medicamento en particular. Su médico le administrará medicamentos durante el embarazo y la lactancia solamente si es esencial.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS:

AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE no afecta a la capacidad de conducir o utilizar máquinas. Los efectos sobre su capacidad para conducir y usar máquinas dependerán de los medicamentos que utilicen mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE.

3. ¿Cómo usar AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE?

Siga exactamente las instrucciones de administración de AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE indicadas por su médico. Consulte a su médico si tiene dudas. Un médico o enfermera le administrará AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE. Su médico decidirá qué cantidad necesita, y cuando y como se le administrará. Dependerá de qué medicamentos necesita tomar con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE. Su médico considerará su edad, peso, condición y qué otros tratamientos está recibiendo.

Si ha recibido demasiada AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE puede sufrir hemólisis. La hemólisis se da cuando los glóbulos rojos absorben agua y explotan.

Los medicamentos mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE pueden causar también síntomas si se administran en cantidades demasiado elevadas. Los síntomas y signos de sobredosis dependerán de los medicamentos que estén usando mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE.

Si accidentalmente se le administra una sobredosis su tratamiento se parará y se le administrará un tratamiento que dependerá de sus síntomas.

Debe leer el prospecto de los medicamentos mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE para la lista de posibles síntomas de la sobredosificación. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

4. Posibles efectos adversos.

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Puede sufrir hemólisis (hinchamiento y explote de glóbulos rojos) si:

Usa Debe leer el prospecto de los medicamentos mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE para la lista de posibles síntomas de la sobredosificación.

Agua para preparaciones inyectables se usa para hacer soluciones inyectables o para perfusión que no es de consistencia similar a su sangre (isotónicas).

Si se añade un medicamento a Debe leer el prospecto de los medicamentos mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE para la lista de



posibles síntomas de la sobredosificación, el medicamento añadido puede causar efectos adversos. Estos efectos adversos dependerán del medicamento que se ha añadido. Debe leer el prospecto del medicamento añadido para la lista de posibles síntomas. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

Ante la sospecha de Reacción o Evento adverso asociado al uso del medicamento, debe comunicar al Centro Nacional de Farmacovigilancia a través del sistema de notificación en línea (<http://cnfv.salud.sv>) en hoja RAM/ESAVI, por vía telefónica al 2522-5056 o directamente al Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Paill al correo electrónico farmacovigilancia@paill.com o por vía telefónica al 2231-3643.

FECHA DE REVISIÓN.

Abril 2019.

PRESENTACIONES:

Ampolla x 2mL. Ampolla x 5mL. Ampolla x 10mL. Vial x 50mL.

MODALIDAD DE VENTA:

Sin Receta Médica.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Producto Centroamericano, fabricado en El Salvador por Laboratorios Farmacéuticos PAILL.