

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD
AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE.

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Agua Destilada c.s.p. 1.0mL

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución Inyectable.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

El agua para inyección se distribuye rápidamente por todo el organismo pasando primero al plasma y de allí al líquido intersticial e intracelular. La eliminación se realiza por orina, heces y en forma de vapor de agua por los pulmones o en forma de sudor (pérdidas insensibles).

DATOS PRECLÍNICOS SOBRE SEGURIDAD

No aplica.

INDICACIONES

Como disolvente para soluciones y/o fármacos de administración parenteral.

Como disolvente para fármacos en polvo o liofilizados, previamente a su administración.

CONTRAINDICACIONES:

No se han descrito.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Disolver los fármacos utilizando la cantidad específica para cada uno de ellos.

No debe administrarse por vía intravenosa sin isotonización previa, ya que en caso contrario puede producir hemólisis de los eritrocitos sanguíneos.

INTERACCIONES

No se conocen hasta la fecha.

FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA

El agua para inyección carece de toxicidad intrínseca en embarazo y lactancia.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS.

No procede.

REACCIONES ADVERSAS:

Pueden presentarse síntomas de hiperhidratación sin retención salina, tras una administración excesiva.

Si se añade un medicamento a Debe leer el prospecto de los medicamentos mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE para la lista de posibles síntomas de la sobredosificación, el medicamento añadido puede causar efectos adversos. Estos efectos adversos dependerán del medicamento que se ha añadido. Debe leer el prospecto del medicamento añadido para la lista de posibles síntomas.

Ante la sospecha de Reacción o Evento adverso asociado al uso del medicamento, debe comunicar al Centro Nacional de Farmacovigilancia a través del sistema de notificación en línea (<http://cnfv.salud.sv>) en hoja RAM/ESAVI, por vía telefónica al 2522-5056 o directamente al Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Paill al correo electrónico farmacovigilancia@paill.com o por vía telefónica al 2231-3643.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, Intravenoso.

DOSIS:

Se utilizará en cada caso la cantidad especificada como disolvente para cada fármaco.

SOBREDOSIS:

No se ha descrito.

Debe leer el prospecto de los medicamentos mezclados con AGUDA DESTILADA ESTERIL PL SOLUCION INYECTABLE para la lista de posibles síntomas de la sobredosificación.

ABUSO Y ADICCIÓN:

No procede.

FECHA DE REVISIÓN DE LA MONOGRAFÍA:

Abril 2019.

CATEGORÍA FARMACÉUTICA SEGÚN CLASIFICACIÓN ANATÓMICA TERAPÉUTICA (ATC):

V07AB99, AGENTES SOLVENTES Y DILUYENTES, INCL. SOLUCIONES PARA IRRIGACIÓN.

PRESENTACIONES:

Ampolla x 2mL. Ampolla x 5mL. Ampolla x 10mL. Vial x 50mL.

MODALIDAD DE VENTA:

Sin Receta Médica.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Producto Centroamericano, fabricado en El Salvador por Laboratorios Farmacéuticos PAILL.